

Informazioni sui farmaci per il trattamento delle dipendenze: disturbo da uso di alcol

| NOME | COSA FA | COME SI PRENDE | PERCHÉ QUESTO FARMACO | COSA SAPERE |
|--|---|---|--|--|
| Acamprosato Nome commerciale: Campral | Mi aiuterà a non voler fare uso di alcol. Migliorerà alcuni sintomi legati all'interruzione del consumo di alcol (ad esempio, insonnia, ansia). | Lo assumo per via orale 3 volte al giorno. | Ho un'anamnesi familiare di disturbo da consumo di alcol; sento un forte bisogno di bere alcolici; Molto utile se soffro di sintomi di astinenza quando non bevo. | Questo farmaco può peggiorare i problemi renali se già diagnosticati. Potrebbe essere difficile assumere regolarmente il farmaco perché devo prenderlo 3 volte al giorno. |
| Disulfiram Nome commerciale: Antabuse | Mi farà star male se bevo alcolici. | Lo assumo per via orale una volta al giorno. | Ho un'anamnesi familiare di disturbo da consumo di alcol; non riesco a smettere di pensare di consumare alcol; ho già avuto benefici da disulfiram in passato; ho una forte rete di supporto su cui contare per assumerlo. | Questo farmaco può causare problemi al fegato o al cuore. Non va assunto in caso di gravidanza o problemi medici cronici come malattie cardiache o diabete. Non è utile se non sono in grado di smettere completamente di assumere alcol perché bere mentre assumo questo farmaco mi farà star male. |
| Naltrexone Nome commerciale: ReVia Per via orale: Vivitrol Per iniezione: | Mi aiuterà a non voler fare uso di alcol. Non avvertirò un forte bisogno di bere. Se bevo alcol, non ne sentirò subito gli effetti. | Lo assumo per via orale una volta al giorno oppure posso fare un'iniezione una volta al mese. | Molto utile se ho un'anamnesi familiare di disturbo da consumo di alcol; abbastanza utile se ho un forte bisogno di assumere alcol; aiuta le persone a ridurre il consumo di alcol, oltre ad aiutarne alcune a smettere completamente. | Questo farmaco non è consigliato in caso di gravi patologie del fegato o se sto facendo uso di oppioidi. L'iniezione può essere dolorosa. Le iniezioni non sono consigliate se ho paura degli aghi. Se devo assumere oppioidi per il dolore, non funzioneranno altrettanto bene o altrettanto facilmente e dovrò consultare il mio medico per trovare un'alternativa efficace. |

Fonte: Modificato da SAMHSA/CSAT TIP 49, aggiornato al 9/2022.

Informazioni sui farmaci per il trattamento delle dipendenze: disturbo da uso di oppioidi

| NOME | COSA FA | COME SI PRENDE | PERCHÉ QUESTO FARMACO | COSA SAPERE |
|---|---|---|---|--|
| Buprenorfina Nome commerciale: Per via orale: ~Suboxone ~Zubsolv ~Subutex ~Altri nomi Per iniezione: ~Sublocade | Mi aiuterà a non voler fare uso di oppioidi. Sentirò anche meno l'astinenza da oppioidi. Mi proteggerà in parte da un'overdose se faccio uso di oppioidi. | Si tratta di una pellicola o di una compressa da tenere sotto la lingua una o più volte al giorno. L'iniezione viene somministrata mensilmente. | Se lotto contro il desiderio di oppioidi e/o l'astinenza da oppioidi; se sono incinta o sto allattando, questo farmaco è una buona opzione; se voglio avere la comodità di farmi prescrivere il farmaco in farmacia per assumerlo a casa; se ho problemi ad assumere il farmaco ogni giorno, posso assumerlo per iniezione. | Questo farmaco può causare astinenza da oppioidi se ne faccio ancora uso quando inizio ad assumerlo. |
| Metadone | Mi aiuterà a non voler fare uso di oppioidi. Non proverò astinenza da oppioidi. Mi proteggerà in parte da un'overdose se faccio uso di oppioidi. | Lo assumo per via orale una volta al giorno. Di solito si presenta in forma liquida e da bere. | Se mi inietto gli oppioidi; se non riesco a smettere di farne uso o a pensare di farne uso; quando non ne faccio uso, ho brutte crisi di astinenza da oppioidi; se sono incinta o se allatto, è un'opzione sicura; cerco di smettere, ma finisco per farne di nuovo uso; ho provato altri farmaci e non funzionano con me. | Questo farmaco può causare un'overdose o sonnolenza. Può causare problemi cardiaci o respiratori, soprattutto se faccio uso di benzodiazepine o alcolici durante l'assunzione di questo farmaco. Devo frequentare un programma di trattamento degli oppioidi (Opioid Treatment Program, OTP) per ricevere il mio farmaco: non si tratta di un farmaco che viene prescritto in farmacia per essere assunto a casa (potrei ottenere dosi dall'OTP da portare a casa). |
| Naltrexone Nome commerciale: Vivitrol | Mi aiuterà a non voler fare uso di oppioidi. Non sarò in grado di sentire l'effetto di altri oppioidi durante l'assunzione di questo farmaco. | Farò un'iniezione una volta al mese. | Se lotto contro il desiderio di oppioidi e/o l'astinenza da oppioidi e non ho mai provato alcun farmaco; se ho problemi ad assumere farmaci ogni giorno, posso assumere il farmaco per iniezione; il metadone o la buprenorfina non hanno funzionato con me o ne ho subito gli effetti collaterali. | Questo farmaco non è consigliato in caso di gravi patologie del fegato o se sto facendo uso di oppioidi. Se ho fatto uso di oppioidi di recente, può causare una grave astinenza da oppioidi quando inizio ad assumerlo. L'iniezione può essere dolorosa. Le iniezioni non sono consigliate se ho paura degli aghi. Se devo assumere oppioidi per il dolore, non funzioneranno altrettanto bene o altrettanto facilmente e dovrò consultare il mio medico per trovare un'alternativa efficace. Se interrompo questo farmaco, il rischio di overdose da oppioidi è più elevato. |

Fonte: Modificato da SAMHSA/CSAT TIP 49, aggiornato al 9/2022.