

מעדיצין פאר אדיקשאן באהאנדלונג פאר אלקאהאל באנוץ דיסארדער

נאמען	וואס וועט דאס טון?	וויאזוי נעם איך די מעדיצינען?	פארוואס זאל איך אויסוועלן די מעדיציין?	וואס זאל איך וויסן?
<p>Acamprosate טרעיד נאמען: Campral</p>	<p>עס וועט מיר העלפן נישט וועלן נוצן אלקאהאל. עס וועט פארלייכטערן געוויסע סימפטאמען פארבינדן מיטן אויפהערן אלקאהאל (צ.ב. נישט קענען שלאפן, ענקזייעטי).</p>	<p>איך נעם עס דורכן מויל 3 מאל א טאג.</p>	<p>איך האב א פאמיליע היסטאריע פון אלקאהאל באנוץ דיסארדער; איך האב א שטארקע דראנג צו טרונקען אלקאהאל; זייער בייהילפיג אויב איך לייד פון צוריקצואנג סימפטאמען ווען איך טרונק נישט.</p>	<p>די מעדיצין קען פארערגערן נירן פראבלעמען אויב איך לייד פון נירן פראבלעמען. עס קען זיין שווער צו נעמען מיין מעדיצין אויף א רעגלמעסיגן שטייגער וויבאלד איך מוז עס נעמען 3 מאל א טאג.</p>
<p>Disulfiram טרעיד נאמען: Antabuse</p>	<p>דאס וועט מיר מאכן שפירן קראנק אויב איך טרונק אלקאהאל.</p>	<p>איך נעם עס דורכן מויל איין מאל א טאג.</p>	<p>איך האב א פאמיליע היסטאריע פון אלקאהאל באנוץ דיסארדער; איך קען נישט אויפהערן טראכטן וועגן נוצן אלקאהאל; איך האב שוין אמאל בענעפטירט פון disulfiram; איך האב א שטארקע שטיצע נעטווארק צו מאכן זיכער אז איך נעם עס.</p>	<p>די מעדיצין קען פאראורזאכן לעבער און הארץ פראבלעמען. עס איז נישט גוט עס צו נעמען אויב איך בין שוואנגערדיג אדער האב כראנישע מעדיצינישע פראבלעמען אזויווי הארץ קראנקייט אדעק צוקער קראנקייט. עס איז נישט בייהילפיג אויב איך קען נישט גענצליך אויפהערן נוצן אלקאהאל ווייל איך וועל ווערן קראנק אויב איך טרונק בשעת איך נעם די מעדיצין.</p>
<p>Naltrexone טרעיד נאמען: ReVia דורכן מויל: Vivitrol דורך איינשפריץ:</p>	<p>עס וועט מיר העלפן נישט וועלן נוצן אלקאהאל. איך וועל נישט האבן קיין שטארקע דראנג צו טרונקען. אויב איך נעם א טרונק, וועל איך נישט שפירן די ווירקונגען אזוי שטארק.</p>	<p>איך נעם עס דורכן מויל איין מאל א טאג, אדער קען איך באקומען אן איינשפריץ איין מאל א מאנאט.</p>	<p>זייער בייהילפיג אויב איך האב א פאמיליע היסטאריע פון אלקאהאל באנוץ דיסארדער; עטוואס בייהילפיג אויב איך האב א שטארקע דראנג צו נוצן אלקאהאל; עס העלפט מענטשן פארמינערן דאס טרונקען אין צוגאב צו העלפן טייל מענטשן אויפהערן טרונקען.</p>	<p>די מעדיצין איז נישט רעקאמענדירט אויב איך האב שווערע לעבער קראנקייט אדער אויב איך נוץ יעצט אפיאוידס. עס קען זיין ווייטאגליך צו נעמען דעם איינשפריץ. איינשפריצן זענען נישט רעקאמענדירט אויב איך האב א פחד פון נאדלען. אויב איך דארף נעמען אפיאוידס קעגן שמערצן, וועט דאס נישט ארבעטן אזוי גוט אדער אזוי גרינג, און איך וועל דארפן ארבעטן מיט מיין פראוויידער צו טרעפן עפעס וואס וועט יא ארבעטן.</p>

קוואל: צוגעפאסט פון SAMHSA/CSAT TIP 49, אפדעיט'עד 9/2022

מעדיצין פאר אדיקשאן באהאנדלונג פאר אפיאויד באנוץ דיסארדער

וואס זאל איך וויסן?	פארוואס זאל איך אויסוועלן די מעדיצין?	וויאזוי נעם איך די מעדיצינישע?	וואס וועט דאס טוהן?	נאמען
<p>די מעדיצין קען פאראורזאכן אפיאויד צוריקצואונג אויב איך נוצן נאך אפיאוידס ווען איך הויבן אן עס נעמען.</p>	<p>אויב איך ראנגל זיך מיט אפיאויד גלוסטענישן און/אדער אפיאויד צוריקצואונג; אויב איך בין שוואנגערדיג אדער איך זייג, איז די מעדיצין א גוטע אויסוואל; אויב איך וויל האבן די באקוועמליכקייט פון באקומען מיין מעדיצין פרעסקרייבט צו אן אפטייק פאר מיר אהיימצונעמען; איך קען נעמען די מעדיצין דורך איינשפריץ אויב איך האב א פראבלעם מיטן נעמען מעדיצין יעדן טאג.</p>	<p>דאס איז א פילם אדער א טאבלעט וואס איך נעם אונטער די צונג איין אדער מער מאל א טאג. דאס איז אן איינשפריץ וואס איך באקום מאנאטליך.</p>	<p>עס וועט מיר העלפן נישט וועלן נוצן אפיאוידס. איך וועל אויך האבן ווייניגער אפיאויד צוריקצואונג. עס וועט מיר טיילווייז באשיצן פון אן איבערדאזע אויב איך נוצן יא אפיאוידס.</p>	<p>Buprenorphine טרעיד נאמען: דורכן מויל: Suboxone~ Zubsolv~ Subutex~ אנדערע נעמען דורך איינשפריץ: Sublocade~</p>
<p>די מעדיצין קען פאראורזאכן אן איבערדאזע אדער מיר מאכן שלעפפריג. עס קען פאראורזאכן הארץ פראבלעמען אדער פראבלעמען מיטן אטעמען, ספעציעל אויב איך נוצן benzodiazepines אדער אלקאהאל בשעת איך נעם די מעדיצין. איך מוז גיין צו אן אפיאויד באהאנדלונג פראגראם (Opioid Treatment Program, OTP) כדי צו באקומען מיין מעדיצין - עס איז נישט קיין מעדיצין וואס איז פרעסקרייבט צו אן אפטייק פאר מיר אהיימצונעמען (איך קען מעגליך באקומען דאזעס אהיימצונעמען פון די OTP).</p>	<p>אויב איך שפריץ איין אפיאוידס; אויב איך קען נישט אויפהערן נוצן אדער טראכן וועגן נוצן; ווען איך נוצן נישט, האב איך שווערע אפיאויד צוריקצואונג; אויב איך בין שוואנגערדיג אדער זייגעדיג, איז דאס א פארזיכערטע אויסוואל; איך פרוביר אויפצוהערן נוצן אבער עס פאסירט אז איך נוצן נאכאמאל; איך האב פרובירט אנדערע מעדיצינען און זיי ארבעטן נישט פאר מיר.</p>	<p>איך נעם עס דורכן מויל איין מאל א טאג. עס וועט געווענליך זיין אין פליסיגע פארם און עפעס וואס איך טרונק.</p>	<p>עס וועט מיר העלפן נישט וועלן נוצן אפיאוידס. איך וועל נישט דורכגיין אפיאויד צוריקצואונג. עס וועט מיר טיילווייז באשיצן פון אן איבערדאזע אויב איך נוצן יא אפיאוידס.</p>	<p>Methadone</p>
<p>די מעדיצין איז נישט רעקאמענדירט אויב איך האב שווערע לעבער קראנקהייט אדער אויב איך נוצן יעצט אפיאוידס. אויב איך האב לעצטנס גענוצט אפיאוידס, קען עס פאראורזאכן ערנסטע אפיאויד צוריקצואונג ווען איך הויבן עס אן. עס קען זיין ווייטאגליך צו נעמען דעם איינשפריץ. איינשפריץן זענען נישט רעקאמענדירט אויב איך האב א פחד פון נאדלען. אויב איך דארף נעמען אפיאוידס קעגן שמערצן, וועט דאס נישט ארבעטן אזוי גוט אדער אזוי גרינג, און איך וועל דארפן ארבעטן מיט מיין פראוויידער צו טרעפן עפעס וואס וועט יא ארבעטן. אויב איך הער אויף נעמען די מעדיצין, בין איך אין א גרעסערע ריזיקע פאר אפיאויד איבערדאזע.</p>	<p>אויב איך ראנגל זיך מיט אפיאויד גלוסטענישן און/אדער אפיאויד צוריקצואונג און איך האב נאך קיינמאל נישט פרובירט קיין מעדיצין; אויב איך קען נעמען די מעדיצין דורך איינשפריץ, אויב איך האב א פראבלעם מיטן נעמען מעדיצין יעדן טאג; Methadone אדער buprenorphine האבן נישט געארבעט פאר מיר אדער איך האב געהאט זייטיגע ווירקונגען פון זיי.</p>	<p>איך וועל באקומען אן איינשפריץ איין מאל א מאנאט.</p>	<p>עס וועט מיר העלפן נישט וועלן נוצן אפיאוידס. איך וועל נישט קענען פילן קיין אנדערע אפיאוידס ווען איך נעם די מעדיצין.</p>	<p>Naltrexone טרעיד נאמען: Vivitrol</p>